



751-6212-00L

Angewandte Zuchtwertschätzung für Nutztiere

Birgit Gredler-Grandl

Who is who? Who are you?



- Motivation für diese Vorlesung?
- Was sind die Erwartungen?

Angewandte Zuchtwertschätzung für Nutztiere

- **Ziel:**
- Kennenlernen der angewandten Zuchtwertschätzung bei Rind, Schwein, Schaf und Ziege in der Schweiz
- Kennen der Zuchtziele (Selektionsindex), Merkmale und Modelle
- Interpretation der Zuchtwerte mit Rechenbeispiel



Übersicht VO-Termine

Angewandte Zuchtwertschätzung Birgit Gredler
3. April
10. April
24. April
8. Mai
15. Mai: Besuch Qualitas AG, Braunvieh Schweiz in Zug
22. Mai: Gast Andreas Hofer (Suisag), Präsentation Gruppenarbeit
29. Mai: schriftliche Prüfung
Unterlagen: https://charlotte-ngs.github.io/GELASMFS2017/

Besuch bei Qualitas AG und Braunvieh Schweiz

- 15. Mai 2017
- Uhrzeit 08:00 bis 10:00
- Adresse: Chamerstrasse 56, 6300 Zug


- Referenten:
- Geschäftsführer Qualitas AG: Dr. Jürg Moll
- Geschäftsführer Braunvieh Schweiz: Dr. Lucas Casanova



Gruppenarbeit

Zuchtzieldefinition und Entwicklung eines entsprechenden Selektionsindexes

- Aufgabenstellung:
- Zuchtziel für neue Rahmenbedingungen entwickeln und beschreiben
- Zur Zielerreichung muss ein geeignetes Werkzeug für die Selektion der Tiere bereitstehen - Selektionsindex
- Neue Rahmenbedingungen beschreiben, z.B.
 - gesellschaftl. Anforderungen an Tierzucht
 - Tierwohl und Tiergesundheit
 - Klimawirkung der Tierproduktion
 - Alptauglichkeit ...
- Zur Verfügung stehen alle Merkmale, für die aktuell eine ZWS besteht.
- Zudem soll mind. ein neues Merkmal miteinbezogen werden




Gruppenarbeit

Zuchtzieldefinition und Entwicklung eines entsprechenden Selektionsindexes

- Aufgabenstellung:
- Überlegungen zur Leistungsprüfung der neuen Merkmale
- Überlegungen zu genetischen Parametern (Heritabilität und genetische Korrelation zwischen den Merkmalen)
- Selektionsindex erstellen mit Gewichtung der Merkmale (relative Gewichtung)
- Präsentation der Ergebnisse am 22. Mai 2017:
 - 10 min Präsentation
 - 5-10 min Diskussion
- Gruppenarbeit geht mit 10% in Endnote ein

Schritte im Zuchtgeschehen



Heutige Vorlesung


- Grundlagen
 - Begriffe
 - Heritabilität und genetische Korrelation
 - Genauigkeit und Sicherheit
- Zuchtwertschätzung Rind in der Schweiz
 - Allgemeines zur nationalen ZWS
 - Internationale ZWS bei Interbull
 - Rechtliche Bestimmungen
 - Ablauf der ZWS
 - Basis und Standardisierung

Quellen

- Kurs Zuchtwertschätzung 2015 (Qualitas AG)
 - Beat Bapst
 - Madeleine Berweger
 - Sophie Kunz
 - Jürg Moll
 - Franz Seefried
 - Urs Schuler
 - Urs Schnyder

- Dr. Christian Fürst: Vorlesung Zuchtwertschätzung beim Rind, Universität für Bodenkultur Wien

Was heisst züchten?



- Züchten ist durch folgende Kriterien gekennzeichnet:
- Definition eines Zuchtzieles
- Art und Weise der Auswahl der Elterntiere muss festgelegt sein – Zuchtprogramm
- Für den Zuchterfolg sind Leistungen der Nachkommen entscheidend (nicht das Leistungsvermögen der Elterntiere an sich)

Was ist der Zuchtwert (ZW)?

Unter dem **Zuchtwert** versteht man die im **Durchschnitt** bei den **Nachkommen** wirksamen **Erbanlagen** eines Tieres.

- Nur jener Teil der Erbanlagen eines Tieres ist züchterisch bedeutend, welcher im Durchschnitt auch bei seinen Nachkommen wirksam wird
- ZW ist im Gegensatz zum Genotyp variabel (keine fixe Grösse)
- Hängt von der genetischen Struktur einer Population ab
- ZW ändert sich mit der jeweiligen Population, zu der man das bestimmte Tier in Beziehung setzt – populationspezifisch
- Mit dem ZW wird nicht die eigene Leistung eines Tieres beurteilt, sondern die Leistung der Nachkommen, wenn es an durchschnittliche Paarungspartner angepaart wird.

Mathematische Definition des wahren Zuchtwerts

$$ZW = 2 * (NKD - PD)$$

- PD = Durchschnitt der jeweiligen Referenzpopulation
- NKD = Leistungsdurchschnitt der Nachkommen
- ZW = zuchtwertbedingte Abweichung des Tieres von PD

- **Wenn folgende Annahmen zutreffen:**
- Anzahl der Nachkommen geht gegen unendlich
- Paarungspartner entsprechen genetisch der Referenzpopulation
- Umwelt, in der Nachkommen ihre Leistung erbringen, muss im Durchschnitt jener der Referenzpopulation entsprechen

Mathematische Definition des wahren Zuchtwerts

$$ZW = 2 * (NKD - PD)$$

- PD = Durchschnitt der jeweiligen Leistungen der Eltern
- NKD = Leistungsdurchschnitt der Nachkommen
- ZW = zuchtwertbedingte Abweichung

Multiplikation der Abweichung mit „2“ → ein Tier bestimmt nur zur Hälfte die Erbanlagen seiner Nachkommen.

- **Wenn folgende Annahmen zutreffen:**
- Anzahl der Nachkommen geht gegen unendlich
- Paarungspartner entsprechen genetisch der Referenzpopulation
- Umwelt, in der Nachkommen ihre Leistung erbringen, muss im Durchschnitt jener der Referenzpopulation entsprechen

Bedingung zur Erfassung des wahren Zuchtwerts

- **Die Anzahl der Nachkommen geht gegen unendlich**
- „Zufallshäufung“ der Erbanlagen bei der Bildung von Samen- bzw. Eizellen
- Entweder zufällig das väterliche oder mütterliche Chromosom gelangt in Samen- bzw. Eizelle
- Stier kann mehr als > 1 Mrd. verschieden veranlagte Samenzellen produzieren, die sich zumindest in einem Chromosom unterscheiden
- Nachkommen repräsentieren nur Zufallsstichprobe

Bedingung zur Erfassung des wahren Zuchtwerts

- **Paarungspartner entsprechen der Referenzpopulation**
- Wenn durchschnittliche genetische Veranlagung der Paarungspartner von Referenzpopulation abweicht, dann wird Abweichung (zur Hälfte) auch an die Nachkommen übertragen.
- Differenz (NKD – PD) durch Zuchtwerte der Paarungspartner verzerrt

Bedingung zur Erfassung des wahren Zuchtwerts

- **Die durchschnittliche Umwelt für die Nachkommen muss der Umwelt für die Referenzpopulation entsprechen**
- NKD ist nicht nur von Erbanlagen abhängig, sondern auch von der jeweiligen Umwelt, in der die Leistungen erbracht werden
- Differenz (NKD - PD) durch die Umwelt der Nachkommen verzerrt
- Damit die Differenz (NKD – PD) frei von Umweltwirkung ist, müssen sich die umweltbedingten Abweichungen der Nachkommenleistungen vom PD in Summe auf Null reduzieren

Bedingung zur Erfassung des wahren Zuchtwerts

**Bedingungen zur Erfassung des wahren Zuchtwerts
sind in der Realität nicht erfüllbar**



Jede Zuchtwertschätzung grundsätzlich fehlerhaft!

Zuchtwertschätzung (ZWS)

- Ziel der ZWS ist die Erstellung einer **Rangierung** der Tiere einer Population gemäss ihrem genetischen Wert
- ZW ist das Kriterium/Werkzeug um Tiere nach ihrem genetischen Potenzial zu rangieren
- Soll Hilfsmittel bei der gezielten Auswahl der Elterntiere sein.
- Genaue Wert des ZW oft weniger entscheidend als die Frage zu wieviel % der besten Tiere ein Tier gehört.

Genetische Parameter - Heritabilität

Heritabilität (Erblichkeit) besagt, wie stark die Leistungsunterschiede von Tieren durch die Erbanlagen bestimmt sind.

- Jede Leistung ergibt sich aus Erbanlagen und Umwelteinflüssen
- Verhältniszahl zwischen 0 und 1
- Populationsspezifisch
- Keine Konstante
- Hängt stark davon ab, wie unterschiedlich die Umwelt ist bzw. wie gut diese erfasst werden kann
- Schätzwert: Schätzung aufgrund Stichprobe der gesamten Population und ist deshalb mit Schätzfehler behaftet. Zur Genauigkeit der Heritabilität wird Standardabweichung angegeben.

Genetische Parameter - Heritabilität

$$h^2 = \frac{\sigma_A^2}{\sigma_P^2}$$

Additiv genetische Varianz

Phänotypische Varianz (genetische +
Umweltvariation)



Schlechte Umwelterfassung: Fehlende
Besamungen, Befragung von
Merkmalen, ... machen Heritabilität
niedriger!

Niedrige Heritabilität bedeutet nicht
automatisch, dass es keine grossen
genetischen Unterschiede gibt!

Genetische Parameter – Heritabilität

Tierart	Merkmal	h^2 von - bis
Rind	Milchmenge	
	Fettgehalt	
	Tägliche Zunahme	
	Fruchtbarkeit	
	Widerristhöhe	
Schwein	Tägliche Zunahme	
	Rückenspeckdicke	
	Körperlänge	
	Wurfgrösse	


Genetische Parameter – genetische Korrelation

Der genetische Korrelationskoeffizient (r_g) gibt an, in welchem Ausmass zwei Merkmale **genetisch** zusammenhängen.

- Züchterisch interessant ist additiv genetische Korrelation
- Pleiotropie und Kopplung als Ursache:
 - Pleiotropie: Eigenschaft der Allele eines Locus, die phänotypische Ausprägung von mehreren Merkmalen zu beeinflussen.
 - Kopplung: Allele/Gene werden immer gekoppelt vererbt
- Werte von -1 bis +1
- Im mathematischen Sinne spricht man von positiven, neutralen und negativen genetischen Korrelationen
- Im tierzüchterischen Sinne spricht man von **erwünschten** und **unerwünschten** Korrelationen
- Merkmale mit unerwünschter genetischer Korrelation sind schwieriger gemeinsam züchterisch zu verbessern


Genetische Parameter – genetische Korrelation

- **Beispiele Rind:**
- Milchmenge – Eiweissmenge: 0.90
- Milchmenge – Eiweissgehalt: -0.40
- Milchmenge – Ausschlachtungsleistung: -0.20
- Milchmenge – Zellzahl: 0.30 (unerwünscht!)
- Milchmenge – Fruchtbarkeit: -0.30 bis -0.60


Bsp: Braunviehstiere**Korrelation ZW Milch-kg und ZW Eiweiss-kg: 0.85**

Bsp: Braunviehstiere

Korrelation ZW Milch-kg und ZW Eiweiss-%: -0.31



Bsp: Braunviehstiere

Korrelation ZW Milch-kg und Fruchtbarkeit: -0.37 

Prinzip der Zuchtwertschätzung

1. Modell der Leistung:


$$\mathbf{P}h\ddot{a}n\ddot{o}t\ddot{y}p = \mathbf{G}en\ddot{o}t\ddot{y}p + \mathbf{U}mwelt$$

- → Genetik = Phänotyp (Leistung) – Umwelt
- → rechnerisch korrekte Trennung von genetischen und umweltbedingten Effekten
- Es können nur additiv-genetische Effekte erfasst werden

Prinzip der Zuchtwertschätzung

2. Verwandte haben Anteil gleicher Gene

- Über die genetische Veranlagung eines Tieres sagt nicht nur seine eigene Leistung etwas aus, sondern auch die Leistungen verwandter Tiere
- optimale Gewichtung der Leistungen verwandter Tiere



Massnahmen in Zuchtwertschätzung

- **Berücksichtigung aller verfügbaren Leistungsinformationen von Verwandten**
 - Informationsgehalt abhängig von Verwandtschaftsgrad und Heritabilität
- **Berücksichtigung des genetischen Niveaus der Anpaarungspartner**
 - Zufällige Abweichung und Vorselektion der Paarungspartner von der Referenzpopulation führt zu Verzerrungen
 - Simultane Schätzung der Zuchtwerte für alle Tiere ermöglicht Zuchtwerte der Paarungspartner rechnerisch konstant zu halten
- **Berücksichtigung systematischer Umwelteinflüsse**
 - Für alle Tiere werden rechnerisch gleiche Umweltverhältnisse simuliert

Genauigkeit und Sicherheit der ZWS



- Zuchtwerte stellen **Schätzwerte** für die wahren Zuchtwerte dar
- Der Zuchtwert ist deshalb immer mit **Fehler** behaftet
- Ein geschätzter Zuchtwert ist der **wahrscheinlichste**, im **Durchschnitt zu erwartende Wert**
- Die **Sicherheit bzw. Genauigkeit** sind Masse für die **Zuverlässigkeit bzw. Qualität** von Zuchtwerten (bzw. der Zuchtwertschätzung)

Genauigkeit und Sicherheit der ZWS

Genauigkeit

(*engl. accuracy*)

Korrelation zwischen wahren und geschätztem Zuchtwert

$$r (r_{a,\hat{a}})$$

Sicherheit

(*engl. reliability*)

Genauigkeit quadriert

$$r^2 (r^2_{a,\hat{a}})$$

statistisch: Bestimmtheitsmass (B%)


Werte zwischen 0 und 1 (keine Einheit)

Genauigkeit und Sicherheit der ZWS


- Die Sicherheit hängt ab:
 - Heritabilität (Erblichkeit) des Merkmals (je höher desto höher)
 - Umfang und Qualität der Informationen für die Zuchtwertschätzung (je mehr desto höher)
 - Vorfahrenleistung, Eigenleistung, Leistungen von Geschwistern und Nachkommen, etc ...

Verteilung der wahren Zuchtwerte bei einem geschätzten Zuchtwert von +500 kg Milch bei versch. Sicherheiten

Je höher die Sicherheit, desto geringer das züchterische Risiko!



Zuchtwertschätzung beim Rind in der Schweiz



Zuchtwertschätzung beim Milchrind

- Qualitas AG führt die ZWS für folgende Rassen im Auftrag der Rinderzuchtorganisationen durch:
 - Braunvieh
 - Holstein
 - Simmental
 - Swiss Fleckvieh
 - Jersey
 - Eringer

Zuchtwertschätzung beim Milchrind

**Nationale
Zuchtwertschätzung**



**Internationale
Zuchtwertschätzung**



Warum internationale ZWS?

- Züchter wollen ausländische Stiere einsetzen und deren Zuchtwerte deshalb vergleichen.
- Aber: Modell, Basis, Streuung, Skala aus verschiedenen Ländern nicht vergleichbar!

CHE	ISEL	Milch	USA	TPI	Milch
Saphir	1456	+421	Freddie	2217	+1135
Colin	1362	+623	Levi	2207	+1006
Jerry	1330	+573	Man-O-Man	2206	+1277

Warum internationale ZWS?

- 60er und 70er-Jahre: Genetik aus Nordamerika nach Europa, die besten (und sanitärisch verfügbaren) Stiere wurden ausgewählt und eingesetzt, Original-ZW verwendet
- Angebot wurde grösser, Züchter wollen besseren Vergleich der Zuchtwerte:
 - Ist ZW 1000 kg aus Kanada vergleichbar mit 1000 kg USA, mit 1000 kg CH?
- 90er-Jahre: Genetik aus Europa nach Nordamerika, generell weltweiter Handel
- → Stiere haben Töchter mit Leistungen in vielen Ländern → Verknüpfungen und Verwandtschaftsbeziehungen über Ländergrenzen hinweg

Internationale ZWS bei Interbull



- Interbull = International bull evaluation service
- <http://www.interbull.org>
- Sitz in Uppsala (Schweden)
- Seit 1994 internationale ZWS für Milch
- Finanzierung durch Mitgliedsbeiträge in Abhängigkeit von Kuhzahl

Internationale ZWS bei Interbull





- Methode: MACE (Multiple Across Country Evaluation)
- Entwickelt in den 90er Jahren
- Mehrmerkmals-Modell: Merkmal Milch-kg ist unterschiedliches Merkmal pro Land (Milch-kg USA, Milch-kg CH, Milch-kg FRA, ...)
- Informationen aus allen Ländern verwendet (Stiere haben Töchter in USA, CAN, DEU, ITA, ...)
- Nationale Stier-Zuchtwerte werden kombiniert
- Jedes Land erhält Liste mit Stier-ZW auf der eigenen Länderskala
- Re-ranking der Stiere ist möglich:
 - Genotyp-Umwelt Interaktionen
 - Unterschiedliche Schätz-Modelle in Ländern
 - Unterschiedliche Merkmals-Definition in Ländern



MACE re-ranking


Nationale ZWS mit nationalen ZW



Interbull-ZWS



Interbull-ZWS





Korrelationen zwischen Ländern Braunvieh Milch-kg

	CAN	FRA	USA	CHE	ITA	DEA	NLD	SVN	NZL
CAN									
FRA	0.89								
USA	0.93	0.89							
CHE	0.90	0.91	0.88						
ITA	0.91	0.87	0.88	0.88					
DEA	0.86	0.86	0.86	0.93	0.90				
NLD	0.91	0.89	0.89	0.89	0.87	0.87			
SVN	0.87	0.86	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86		
NZL	0.76	0.76	0.76	0.77	0.76	0.77	0.76	0.78	
GBR	0.86	0.87	0.86	0.88	0.86	0.86	0.89	0.87	0.76

- Tochter aus NZL ist weniger wert als Tochter in DEA



Korrelationen zwischen Ländern Holstein Milch-kg

	CAN	DEU	DFS	FRA	ITA	NLD	USA	CHE	GBR	NZL	AUS
CAN											
DEU	0.91										
DFS	0.94	0.93									
FRA	0.92	0.89	0.93								
ITA	0.91	0.88	0.90	0.89							
NLD	0.93	0.93	0.94	0.92	0.88						
USA	0.94	0.90	0.93	0.92	0.92	0.91					
CHE	0.92	0.90	0.93	0.96	0.89	0.94	0.90				
GBR	0.87	0.85	0.89	0.87	0.85	0.89	0.86	0.90			
NZL	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.75		
AUS	0.80	0.77	0.77	0.83	0.76	0.80	0.77	0.85	0.78	0.85	
IRL	0.85	0.82	0.85	0.91	0.80	0.87	0.82	0.88	0.82	0.85	0.86



Korrelationen zwischen Ländern Braunvieh Nutzungsdauer

	CAN	CHE	DEA	NLD	NZL	USA	ITA	FRA	GBR
CHE	0.78								
DEA	0.82	0.84							
NLD	0.74	0.71	0.67						
NZL	0.44	0.46	0.35	0.44					
USA	0.93	0.69	0.77	0.81	0.52				
ITA	0.79	0.63	0.8	0.57	0.29	0.69			
FRA	0.71	0.73	0.76	0.67	0.35	0.68	0.59		
GBR	0.81	0.58	0.44	0.69	0.52	0.81	0.60	0.55	
SVN	0.73	0.67	0.81	0.80	0.48	0.74	0.79	0.68	0.59

Internationale ZWS bei Interbull

Rassen und Länder



Produktionsmerkmale *(Anzahl Populationen)*

- HOL (32), RDC (14), JER (11), BSW (10), GUE (6), SIM (12)

Exterieur

- HOL (25), RDC (9), JER (9), BSW (9), GUE (4)

Somatic Cell Score / Mastitis

- HOL (30), RDC (13), JER (8), BSW (10), GUE (6), SIM (11)

Nutzungsdauer

- HOL (21), RDC (10), JER (9), BSW (10), GUE (6), SIM (5)

Geburtsablauf

- HOL (16), RDC (7), BSW (5)

Weibliche Fruchtbarkeit

- HOL (20), RDC (11), JER (9), BSW (9), GUE (6)

Vorteile der Interbull - ZWS



- Leistungsinformationen werden besser genutzt
- ZW für ausländische Stiere ohne Leistung im eigenen Land
- Berücksichtigung aller Verwandtschaften
- Berücksichtigung durchschnittlicher Genotyp-Umwelt-Interaktion
- Verringerung des Risikos durch schwach getestete Stiere


Nachteile der Interbull - ZWS




- Zusätzlicher Arbeitsaufwand (Bereitstellung der nationalen Zuchtwerte und Aufbereitung der Interbull-Zuchtwerte)
- Kosten
- Nur für Stiere
- Informationsgewinn für manche Rasse gering (z.B. Fleckvieh DEA)
- Verwendung der Originalnummern oft problematisch → falsche Verknüpfungen

Zuchtwertschätzung beim Milchrind


- Qualitas AG führt die ZWS für verschiedene Rassen durch:

BRAUNVIEH  Brown Swiss, Braunvieh, Original Braunvieh, Jersey

SWISS 
herdbook Simmental, Swiss Fleckvieh, Red
 Holstein, Holstein



Holstein



Eringer

Gemeinsame Zuchtwertschätzung

Gesetzliche Rahmenbedingungen

- **Tierzuchtverordnung (TZV)** vom 31. Oktober 2012 (Stand am 1. Januar 2016)
- Quelle: <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121964/index.html>
- **Art. 2 Begriffe**
In dieser Verordnung bedeuten:
.....
c. Zuchtwertschätzung: ein nach den geltenden Regeln der Tierzucht wissenschaftlich anerkanntes statistisches Verfahren zur Schätzung des genetischen Wertes eines Tieres im Vergleich zu Tieren derselben Population;
.....

Tierzuchtverordnung

- **Art. 6 Voraussetzungen für Zuchtorganisationen und private Zuchtunternehmen mit Registern für hybride Zuchtschweine**
 - ¹ Als Zuchtorganisation oder privates Zuchtunternehmen für hybride Zuchtschweine wird eine Organisation anerkannt, die:
 - ...
 - f. Zuchtwertschätzungen nach Artikel 9 durchführt;
 - ...

Tierzuchtverordnung

- **Art. 9 Zuchtwertschätzungen**
- ¹ Die Zuchtwertschätzungen müssen nach den geltenden Regeln der Tierzucht wissenschaftlich vertretbar sein.
- ² Zuchtorganisationen, Zuchtorganisationen für hybride Zuchtschweine und private Zuchtunternehmen für hybride Zuchtschweine haben in ihren Reglementen festzulegen:
 - a. die Art und den Umfang der Zuchtwertschätzung;
 - b. das Verfahren der Zuchtwertschätzung;
 - c. die Datengrundlage und den Datenaustausch;
 - d. die Auswertungstermine;
 - e. die Qualitätssicherungsmaßnahmen;
 - f. die Publikationsbedingungen und die Bekanntgabe der Ergebnisse der Zuchtwertschätzung an ihre Mitglieder.


Reglement über die Zuchtwertschätzung

- Braunvieh Schweiz:
<http://homepage.braunvieh.ch/documents/000-Regl-ZWS-NZP-D.pdf>
- Swissherdbook:
https://www.swissherdbook.ch/fileadmin/Domain1/PDF_Dokumente/05-Statistiken-Formulare/56-Reglemente/Zuchtprogramm/Reglement_Zuchtwertschaetzung.pdf
- Schweizerischer Holsteinzuchtverband:
https://www.holstein.ch/wp-content/uploads/2016/11/holstein_publications_reglement_reglement-evalutation-genetique-et-testage_d.pdf



Praktischer Ablauf ZWS Schweiz

- 3-mal jährlich werden Zuchtwerte neu geschätzt:
 - April, August und Dezember
- Veröffentlichung: am 1. oder 2. Dienstag des Monats (Interbull)





Basis und Standardisierung

- Die Basis stellt in der ZWS den **Bezugspunkt** für die geschätzten Zuchtwerte dar
- Tiergruppe wird als Basis definiert (z.B. Kühe oder Stiere bestimmter Geburtsjahrgänge)
- Definition des **Nullpunktes der Zuchtwerte** → durchschnittlicher Zuchtwert der Basistiere = 0 oder 100 (oder 1000 bei Relativzuchtwerten)
- Basisdefinition hat keinen Einfluss auf die Rangierung und Unterschiede zwischen den Tieren

Die Basis: ein Referenzwert für die Zuchtwertschätzung



Fotoquelle: www.t-online.de


Die Basis

- Die Höhe eines Berges wird mit Metern über Meer (m ü. M.) dargestellt (Meer = 0 m)
- Der Uetliberg ist 869 m ü. M. hoch
- Felsenegg ist 800 m ü. M.
- Der Hönigberg ist 541 m ü. M.

Uetliberg
869 m ü. M.


Felsenegg
800 m ü. M.

Hönigberg
541 m ü. M.




Die Basis

- Nun könnte man aber auch Felsenegg (800 m ü. M.) als Nullpunkt (**Basis**) definieren...
 - Der Uetliberg wäre dann 69 m ü. Felsenegg.
 - Andere Berge erhalten Negativwerte: Der Höneggerberg (541 m ü. M.) wäre dann -259 m unter Felsenegg.
- Die Reihenfolge der Berge bliebe aber genau die gleiche...



Was ist die Basis der Zuchtwerte?


- Die Basis stellt den Bezugspunkt für geschätzten Zuchtwerte dar und wird einmal im Jahr „nachgerückt“ (gleitende Basis)
- Zuchtwerte von älteren Tieren werden kontinuierlich „abgeschrieben“, da die „Latte“ von Jahr zu Jahr höher gelegt wird (bei Zuchtfortschritt)



Standardisierung

- Zur richtigen Einschätzung von Einzeltieren in der Population ist die Berücksichtigung der Streuung (Standardabweichung) der Zuchtwerte erforderlich.
- Relativzuchtwerte werden auf ein Mittel von 100 (bzw. 1000) mit einer wahren genetischen Standardabweichung von 12 (bzw. 120) Punkten eingestellt.
- $100 + (\text{ZW-natural} - \text{Mittelwert Basis}) * 1 * 12 / s_a$
- Zuchtwerte über 100 (bzw. 1000) züchterisch wünschenswert (Ausnahme Exterieur)

Darstellung der Zuchtwerte



Merkmale

Milch	(Fleisch)	Fitness	Exterieur
Milch – kg	Nettozuwachs	Nutzungsdauer	Rahmen
Fett – kg	Fleischigkeit CHTAX	Weibliche Fruchtbarkeit	Becken
Eiweiss - kg		Geburtsverlauf	Euter
Fett %		Zellzahl	Fundament
Eiweiss %		Persistenz	
		Melkbarkeit	